

باسم‌هه تعالی

ساعت شروع: ۳۰:۱۰ صبح	رشته‌ی: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	سوالات امتحان نهایی درس: شیمی (۳) و آزمایشگاه
مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه		
تاریخ امتحان: ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹	سال سوم آموزش متوسطه	
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزادسرا سرکشور در ۵ ماه سال ۱۳۸۹	



ردیف	نمره	سؤالات																								
توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز است. تا دو رقم پس از اعشار محاسبه کنید.																										
۱		<p>در هر یک از عبارت‌های زیر گزینه‌ی درست را انتخاب و به پاسخ نامه منتقل کنید.</p> <p>(آ) گرماسنج لیوانی برای اندازه‌گیری گرمای واکنش در $\frac{\text{حجم}}{\text{فشار}}$ ثابت به کار می‌رود.</p> <p>(ب) گاز مورد نیاز برای پر کردن کیسه‌های هوای خودروها از تجزیه‌ی $\frac{\text{NaHCO}_3}{\text{NaN}_3}$ به دست می‌آید.</p> <p>(پ) یکی از روش‌های تهییه گاز کلر در آزمایشگاه، واکنش هیدروکلریک اسید (HCl(aq) با $\frac{\text{MnO}_2(\text{S})}{\text{Mg(S)}}$) است.</p> <p>(ت) آنتالپی استاندارد تشکیل $\frac{\text{O(g)}}{\text{O}_2(\text{g})}$ صفر در نظر گرفته می‌شود.</p>																								
۲/۷۵		<p>با توجه به واکنش‌های زیر پاسخ دهید:</p> <p>(آ) معادله‌ی فمادی واکنش (۱) را بنویسید.</p> <p>(ب) واکنش (۲) را موازن و واکنش (۳) را کامل کنید.</p> <p>(پ) نوع واکنش‌های (۲) و (۳) را مشخص کنید.</p> <p>(ت) نماد $\xrightarrow{\Delta}$ در واکنش (۲) چه مفهومی دارد؟</p> <p>۱) $\text{KClO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{KCl(s)} + \text{O}_2(\text{g})$</p> <p>۲) $\text{K}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \dots(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\dots) + 2\text{KNO}_3(\text{aq})$</p>																								
۱/۲۵		<p>با توجه به نمودار رو به رو، عبارت‌های زیر را کامل کنید.</p> <p>(آ) اگر در دمای $\dots \text{ }^\circ\text{C}$، $1/0.0$ گرم از گاز CO_2 در 100°C حل شود، محلول سیر شده خواهد بود.</p> <p>(ب) اتحلال پذیری گاز H_2S در دمای 30°C، 30°C در 100°C برابر است با ... گرم در 100°C آب.</p> <p>(پ) نمودار، اثر ... بر اتحلال پذیری گازها در آب را نشان می‌دهد. عوامل دیگری هم مانند ... و ... نیز بر اتحلال پذیری گازها در آب مؤثرند.</p> <table border="1"> <caption>Data points estimated from the graph</caption> <thead> <tr> <th>Gas</th> <th>20°C</th> <th>30°C</th> <th>40°C</th> <th>50°C</th> <th>60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cl₂</td> <td>0.75</td> <td>0.65</td> <td>0.55</td> <td>0.45</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>H₂S</td> <td>0.45</td> <td>0.35</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>CO₂</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.08</td> <td>0.05</td> <td>0.02</td> </tr> </tbody> </table>	Gas	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	Cl ₂	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	H ₂ S	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	CO ₂	0.25	0.15	0.08	0.05	0.02
Gas	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C																					
Cl ₂	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35																					
H ₂ S	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05																					
CO ₂	0.25	0.15	0.08	0.05	0.02																					
۰/۷۵		<p>در 80°C محلول 15% جرمی پتاسیم نیترات، چند گرم آب وجود دارد؟</p> <p>«ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی دوم»</p>																								

باسمہ تعالیٰ

مدت امتحان : ۱۱۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: شیمی (۳) و آزمایشگاه
تاریخ امتحان: ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۸	سال سوم آموزش متوسطه		
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزادسراسرکشور در دی ماه سال ۱۳۸۹		

ردیف	سؤالات	نمره														
۵	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید در هر مورد دلیل بنویسید.</p> <p>(آ) تغییر انرژی درونی یک سامانه ، قابع حالت است.</p> <p>ب) کمیت های دما، گرما و چگالی از خوص شدقی سامانه به شمار می روند.</p> <p>پ) در پاک کننده های غیرصابونی، ذره های چربی به بخش سولفونات (SO_4^-) می چسبند.</p> <p>ت) مخلوط روغن با آب و مقداری نمک خوراکی شامل دو فاز است.</p>	۲														
۶	<p>با توجه به اطلاعات داده شده، ΔH° واکنش: $\text{Fe}_3\text{O}_4(s) + ۴\text{CO}(g) \rightarrow ۳\text{Fe}(s) + ۴\text{CO}_2(g)$ را محاسبه کنید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ترکیب</th> <th>$\text{Fe}_3\text{O}_4(s)$</th> <th>$\text{CO}(g)$</th> <th>$\text{CO}_2(g)$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>آنالیپی استاندارد تشکیل ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-۱}$)</td> <td>-۸۲۴</td> <td>-۱۱۱</td> <td>-۳۹۴</td> </tr> </tbody> </table>	ترکیب	$\text{Fe}_3\text{O}_4(s)$	$\text{CO}(g)$	$\text{CO}_2(g)$	آنالیپی استاندارد تشکیل ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-۱}$)	-۸۲۴	-۱۱۱	-۳۹۴	۱/۵						
ترکیب	$\text{Fe}_3\text{O}_4(s)$	$\text{CO}(g)$	$\text{CO}_2(g)$													
آنالیپی استاندارد تشکیل ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-۱}$)	-۸۲۴	-۱۱۱	-۳۹۴													
۷	<p>مشخص کنید هر یک از آنتالپی های استاندارد نوشته شده در ستون a ، مربوط به کدام معادله نشان داده شده در ستون b است؟</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ستون a</th> <th>ستون b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱) ΔH° تبخیر $\text{H}_2\text{O}(l)$</td> <td>۱) $\text{CH}_4(g) + ۲\text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + ۲\text{H}_2\text{O}(g)$</td> </tr> <tr> <td>۲) ΔH° پیوند $\text{Cl}_2(g)$</td> <td>۲) $۲\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow ۲\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g)$</td> </tr> <tr> <td>۳) ΔH° تشکیل $\text{CH}_4(g)$</td> <td>۳) $۲\text{Cl}(g) \rightarrow \text{Cl}_2(g)$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>۴) $\text{C}(s, \text{گرافیت}) + ۲\text{H}_2(g) \rightarrow \text{CH}_4(g)$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>۵) $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>۶) $\text{Cl}_2(g) \rightarrow ۲\text{Cl}(g)$</td> </tr> </tbody> </table>	ستون a	ستون b	۱) ΔH° تبخیر $\text{H}_2\text{O}(l)$	۱) $\text{CH}_4(g) + ۲\text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + ۲\text{H}_2\text{O}(g)$	۲) ΔH° پیوند $\text{Cl}_2(g)$	۲) $۲\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow ۲\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g)$	۳) ΔH° تشکیل $\text{CH}_4(g)$	۳) $۲\text{Cl}(g) \rightarrow \text{Cl}_2(g)$		۴) $\text{C}(s, \text{گرافیت}) + ۲\text{H}_2(g) \rightarrow \text{CH}_4(g)$		۵) $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$		۶) $\text{Cl}_2(g) \rightarrow ۲\text{Cl}(g)$	۰/۷۵
ستون a	ستون b															
۱) ΔH° تبخیر $\text{H}_2\text{O}(l)$	۱) $\text{CH}_4(g) + ۲\text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + ۲\text{H}_2\text{O}(g)$															
۲) ΔH° پیوند $\text{Cl}_2(g)$	۲) $۲\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow ۲\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g)$															
۳) ΔH° تشکیل $\text{CH}_4(g)$	۳) $۲\text{Cl}(g) \rightarrow \text{Cl}_2(g)$															
	۴) $\text{C}(s, \text{گرافیت}) + ۲\text{H}_2(g) \rightarrow \text{CH}_4(g)$															
	۵) $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$															
	۶) $\text{Cl}_2(g) \rightarrow ۲\text{Cl}(g)$															
۸	<p>با توجه به واکنش زیر محاسبه کنید:</p> <p>چند گرم کلسیم هیدرید (CaH_2) با درصد خلوص ۷۳٪ برای تهییه ۵/۲ لیتر گاز هیدروژن در شرایط STP ، لازم است؟</p> <p>$1\text{ mol CaH}_2 = ۴۲/۰۹ \text{ g}$</p> <p>$\text{CaH}_2(\text{S}) + ۲\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq}) + ۲\text{H}_2(g)$</p>	۱/۵														
	«ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی سوم»															

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	رشته‌ی: ریاضی فیزیک - علوم تجربی - آزمایشگاه	سوالات امتحان نهایی درس: شیمی (۳) و سال سوم آموزش متوسطه دانش آموزان و داوطلبان آزادسرا سرکشور در دی ماه سال ۱۳۸۹
تاریخ امتحان: ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹	مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	
ردیف		نمره

ردیف	نمره	سوالات
۹	۲	<p>به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:</p> <p>(آ) علت پایداری کلوئیدها را بنویسید.</p> <p>ب) انحلال پذیری اتانول (C_2H_5OH) در آب بیشتر است یا هگزانول ($C_6H_{14}OH$) ؟ چرا؟</p> <p>پ) در شکل رو به رو، نوع برهم کنش بین ذره‌ای را مشخص کنید.</p>  <p>ت) در شکل زیر واکنش در دما و فشار ثابت، زیر یک سیلندر و پیستون روان انجام شده است.</p> <p>مشخص کنید: ΔH° بیشتر است یا ΔE° ؟ چرا؟</p> 
۱۰	۱/۵	<p>با استفاده از داده‌های زیر، ΔH° واکنش داخل کادر را به دست آورید.</p> $N_2H_4(l) + 2H_2O_2(l) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H^\circ = ? \text{ kJ}$ <p>۱) $N_2H_4(l) + O_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta H_1^\circ = -622 \text{ kJ}$</p> <p>۲) $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H_2^\circ = -286 \text{ kJ}$</p> <p>۳) $H_2(g) + O_2(g) \rightarrow H_2O_2(l)$ $\Delta H_3^\circ = -188 \text{ kJ}$</p>
۱۱	۱/۷۵	<p> محلول‌های آبی زیر را در نظر بگیرید و پاسخ دهید:</p> <p> محلول ۱: محلول یک مولال شکر ($C_{12}H_{22}O_{11}$)</p> <p> محلول ۲: محلول یک مولال کلسیم کلرید ($CaCl_2$)</p> <p>(آ) الکترولیت یا غیرالکترولیت بودن محلول‌های ۱ و ۲ را با نوشتن دلیل مشخص کنید.</p> <p>(ب) نقطه جوش کدام محلول کمتر است؟ چرا؟</p>
۱۲	۱/۷۵	<p> مطابق واکنش زیر 5% مول آلومینیم ($Al(s)$) را با 9% مول $HCl(aq)$ مخلوط کردیم.</p> $2Al(s) + 6HCl(aq) \rightarrow 2AlCl_3(aq) + 3H_2(g)$ <p>(آ) واکنش دهنده‌ی محدود گننده را با محاسبه مشخص کنید.</p> <p>(ب) اگر حجم محلول $HCl(aq)$ اولیه 45 میلی لیتر باشد، غلظت مولار آن را به دست آورید.</p>
<p>«ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی چهارم»</p>		

پاسمه تعالی

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	رشته‌ی: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	سوالات امتحان نهایی درس: شیمی (۳) و آزمایشگاه
تاریخ امتحان: ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹	سال سوم آموزش متوسطه		
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزادسرا سرکشور در ۵ ماه سال ۱۳۸۹		

ردیف	سوالات	نمره								
۱۳	به جای موارد آ، ب و پ از واژه‌های مثبت یا منفی برای کامل کردن جدول استفاده کنید. در هر مورد دلیل انتخاب خود را بنویسید.	۱/۵								
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">فرایند</td> <td style="text-align: center;">ΔS°</td> <td style="text-align: center;">ΔH°</td> <td style="text-align: center;">ΔG°</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$C_3H_8(g) + 5 O_2(g) \rightarrow 3 CO_2(g) + 4 H_2O(g)$</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">ب</td> <td style="text-align: center;">پ</td> </tr> </table>	فرایند	ΔS°	ΔH°	ΔG°	$C_3H_8(g) + 5 O_2(g) \rightarrow 3 CO_2(g) + 4 H_2O(g)$	۱	ب	پ	۲۰
فرایند	ΔS°	ΔH°	ΔG°							
$C_3H_8(g) + 5 O_2(g) \rightarrow 3 CO_2(g) + 4 H_2O(g)$	۱	ب	پ							

راهنمای جدول تناوبی عصرها																	
۱		۲		۳		۴		۵		۶		۷		۸		۹	
H		He		Li		Be		B		C		N		O		F	
۱	-	۲	-	۳	-	۴	-	۵	-	۶	-	۷	-	۸	-	۹	-
H	1/1-1	He	1/1-2	Li	2/1-1	Be	3/1-1	B	4/1-11	C	5/1-11	N	6/1-15	O	7/1-16	F	8/1-19
Na	11/1-11	Mg	12/1-12	Al	13/1-13	Si	14/1-14	P	15/1-15	S	16/1-16	Cl	17/1-17	Ar	18/1-18	Kr	19/1-19
K	19/1-19	Ca	20/1-20	Sc	21/1-21	Ti	22/1-22	V	23/1-23	Cr	24/1-24	Mn	25/1-25	Fe	26/1-26	Co	27/1-27
Rb	20/1-20	Ta	21/1-21	Y	22/1-22	Zr	23/1-23	Nb	24/1-24	Mo	25/1-25	Tc	26/1-26	Ru	27/1-27	Pd	28/1-28
Cs	28/1-28	Ba	29/1-29	La	30/1-30	Hf	31/1-31	Ta	32/1-32	W	33/1-33	Re	34/1-34	Os	35/1-35	Ir	36/1-36

با اسمه تعالی

رشته‌ی : ریاضی فیزیک علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس : شیمی (۳) و آزمایشگاه
تاریخ امتحان : ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزادسراسرکشور در دی ماه سال ۱۳۸۹

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	(۲) فشار (۰/۲۵) NaN _۳ (۰/۲۵) O _۲ (g) (۰/۲۵) MnO _۲ (۰/۲۵) پ	۱
۲	<p>۱) H_۲(g) + Cl_۲(g) → HCl(g) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)</p> <p>۲) (۰/۲۵) ۲KClO_۳(s) $\xrightarrow{\Delta}$ ۲KCl(s) + ۳O_۲(g) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)</p> <p>۳) K_۲SO_۴(aq) + Ba(NO_۳)_۲(aq) → BaSO_۴(s) + ۲KNO_۳(aq) (۰/۲۵) (۰/۲۵)</p> <p>پ) واکنش (۲) از نوع تجزیه (۰/۲۵) و واکنش (۳) از نوع جابه جایی دو گانه است. (۰/۲۵)</p> <p>ت) $\xrightarrow{\Delta}$ نشان می دهد واکنش دهنده ها گرم شده اند. (۰/۲۵)</p>	۲/۷۵
۳	(۰/۲۵) دما (۰/۲۵) - فشار (۰/۲۵) نوع گاز (۰/۲۵) ب (۰/۲۵) ۰ / ۳ (۰/۲۵) ۴۰ (۰/۲۵) ت	۱/۲۵
۴	<p>حل شونده (۰/۲۵) $X = ۱۲\text{ g}$</p> <p>درصد جرمی $\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{محلول g}} \times ۱۰۰ = \frac{۱۵}{۱۰۰} = \frac{X\text{ gKNO}_۳}{۸۰\text{ g}}$</p> <p>آب (۰/۲۵) $۸۰ - ۱۲ = ۶۸\text{ g}$</p> <p>فرمول یا جاگذاری (۰/۲۵)</p>	۰/۷۵
۵	<p>آ) درست. (۰/۲۵) زیرا به مسیر انجام فرآیند بستگی ندارد یا فقط به حالت آغازی و پایانی سامانه بستگی دارد. (۰/۲۵)</p> <p>ب) نادرست (۰/۲۵) گرما خاصیت مقداری سامانه است. (۰/۲۵)</p> <p>پ) نادرست (۰/۲۵) ذره های چربی به زنجیره های هیدروکربنی پاک کننده غیرصابونی می چسبند که ناقطبی است (۰/۲۵) (یا آئیون سولفونات بخش قطبی پاک کننده های غیرصابونی است و ذره های چربی ناقطبی هستند).</p> <p>ت) درست (۰/۲۵) نمک در آب حل می شود و مخلوط آب نمک یک فاز و روغن فاز دیگر را تشکیل می دهد. (۰/۲۵)</p>	۲
۶	<p>یا (۰/۲۵)</p> <p>$\Delta H^\circ = \left[\text{مجموع آنتالپی های استاندارد} - \text{مجموع آنتالپی های استاندارد} \right]_{\text{تشکیل فراورده ها}} - \left[\text{مجموع آنتالپی های استاندارد} - \text{مجموع آنتالپی های استاندارد} \right]_{\text{واکنش}}$</p> <p>$\Delta H^\circ = [۳\Delta H^\circ_{\text{تشکیل}} \text{CO}_۲(g) + ۲\Delta H^\circ_{\text{تشکیل}} \text{Fe}(s)] - [۳\Delta H^\circ_{\text{تشکیل}} \text{CO}(g) + \Delta H^\circ_{\text{تشکیل}} \text{Fe}_۲\text{O}_۳(s)]$</p> <p>$\Delta H^\circ = [۳(-۳۹۴) + (۲ \times ۰)] - [۳(-۱۱۱) + (-۸۲۴)] = -۲۵\text{ kJ}$</p> <p>واکنش (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)</p>	۱/۵
	«ادامه در صفحه دوم»	

با اسمه تعالی

رشته‌ی : ریاضی فیزیک - علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس : شیمی (۳) و آزمایشگاه
تاریخ امتحان : ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزادسراسرکشور در دی ماه سال ۱۳۸۹

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۷	۵ (۲) ب) ۶ پ) ۴ (هر مورد ۰/۲۵)	۰/۷۵
۸	$\text{؟} \text{gCaH}_2 = ۲/۵۷ \text{LH}_2 \times \frac{۱\text{molH}_2}{۲۲/۴\text{LH}_2} \times \frac{۱\text{molCaH}_2}{۲\text{molH}_2} \times \frac{۴۲/۰\text{gCaH}_2}{۱\text{molCaH}_2} = ۲/۴۱ \text{ gCaH}_2$ <p style="text-align: center;">خالص</p> $(۰/۲۵) \quad (۰/۲۵) \quad (۰/۲۵) \quad (۰/۲۵)$ <p style="text-align: center;">$\frac{\text{جرم ماده خالص}}{\text{جرم ماده ناخالص}} \times ۱۰۰ = \frac{۷۳}{۱۰۰} \Rightarrow x = ۳/۳ \text{ g CaH}_2$ ناخالص $(۰/۲۵)$</p> <p style="text-align: center;">فرمول یا جاگذاری $(۰/۲۵)$</p>	۱/۵
۹	<p>آ) ذره‌های کلوئید روی سطح خود نوعی بار الکتریکی دارند $(۰/۲۵)$ هنگام نزدیک شدن آن‌ها به هم دافعه‌ی میان بارهای الکتریکی هم نام $(۰/۲۵)$ مانع از ته نشین شدن این ذره‌ها می‌گردد. $(۰/۲۵)$</p> <p>ب) انحلال پذیری اتانول در آب بیشتر از هگزانول است. $(۰/۲۵)$ هر چه بر طول زنجیر هیدروکربنی الكل‌های راست زنجیر افزوده شود، انحلال پذیری آن‌ها در آب کمتر می‌شود. $(۰/۲۵)$</p> <p>پ) برهمنش یون - دوقطبی $(۰/۲۵)$</p> <p>ت) با انجام واکنش حجم افزایش یافته $\Delta E^\circ > \Delta H^\circ$ است $(۰/۲۵)$ در نتیجه $P\Delta V > \Delta H^\circ$ خواهد بود. $(۰/۲۵)$</p>	۲
۱۰	$(۱) \text{N}_2\text{H}_4(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + ۲\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H_1^\circ = -۶۲۲ \text{ kJ}$ <p style="text-align: center;">$\xrightarrow[\text{و اکنش ۲}]{\text{دو برابر نمودن}} (۴) ۲\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow ۲\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H_4^\circ = ۲\times -۲۸۶ = -۵۷۲ \text{ kJ} \quad (۰/۵)$</p> <p style="text-align: center;">$\xrightarrow[\text{نمودن و اکنش ۳}]{\text{وارونه و دو برابر}} (۵) ۲\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow ۲\text{H}_2(\text{g}) + ۲\text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H_5^\circ = +۱۸۸ \times ۲ = +۳۷۶ \text{ kJ} \quad (۰/۵)$</p> <p style="text-align: center;">$\text{N}_2\text{H}_4(\text{l}) + ۲\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + ۴\text{H}_2\text{O}(\text{l})$</p> <p style="text-align: right;">یا</p> <p>$(۰/۵) \Delta H_1^\circ = ۲\times -۲۸۶ = -۵۷۲ \text{ kJ}$ آن‌هم دو برابر می‌شود ΔH°</p> <p>$(۰/۵) \Delta H_5^\circ = +۱۸۸ \times ۲ = +۳۷۶ \text{ kJ}$ آن‌تغییر کرد و دو برابر می‌شود ΔH°</p> <p>$\Delta H^\circ = \Delta H_1^\circ + \Delta H_4^\circ + \Delta H_5^\circ = -۶۲۲ - ۵۷۲ + ۳۷۶ = -۸۱۸ \text{ kJ}$</p>	۱/۵
	« ادامه در صفحه‌ی سوم »	

با سمه تعالی

رشته‌ی : ریاضی فیزیک - علوم تجربی	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس : شیمی (۳) و آزمایشگاه
تاریخ امتحان : ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۸	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانش آموزان و داوطلبان آزادسرا کشور در هی ماه سال ۱۳۸۹

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۱	<p>(آ) شکر در آب به صورت مولکولی حل می شود (۰/۲۵) پس محلول آن غیر الکترولیت است. (۰/۲۵) در CaCl_2 آب یونیزه شده (۰/۲۵) محلول آن الکترولیت است. (۰/۲۵)</p> <p>(ب) نقطه جوش محلول (۱) کمتر است (۰/۲۵) زیرا تعداد ذره های حل شونده‌ی غیر فرار در سطح مایع کمتر بوده یا سرعت تبخیر سطحی آب بیشتر است. (۰/۲۵) فشار بخار محلول بیشتر خواهد بود. (۰/۲۵)</p>	۱/۷۵
۱۲	<p>(راه حل اول)</p> $\frac{۰/۰۹ \text{ mol HCl}}{۶ \text{ mol HCl}} = ۰/۰۱۵ \quad (۰/۲۵)$ $۰/۰۲۵ > ۰/۰۱۵ \Rightarrow \text{HCl واکنش دهنده محدود کننده است.} \quad (۰/۲۵)$ $\frac{۰/۰۵ \text{ mol Al}}{۲ \text{ mol Al}} = ۰/۰۲۵ \quad (۰/۲۵) \quad (۰/۲۵)$ <p>(راه حل دوم) فرض می کنیم Al واکنش دهنده محدود کننده است.</p> $\frac{۰/۰۵ \text{ mol Al}}{۰/۰۹ \text{ mol HCl}} = \frac{۶ \text{ mol HCl}}{۲ \text{ mol Al}} = ۰/۱۵ \text{ mol HCl} \quad (۰/۲۵)$ $۰/۰۹ \text{ mol HCl} < ۰/۰۱۵ \text{ mol HCl} \quad (۰/۲۵)$ <p>فرض ما نادرست بوده و HCl واکنش دهنده محدود کننده است. (۰/۲۵)</p> $M = \frac{n}{V} \Rightarrow M = \frac{۰/۰۹ \text{ mol HCl}}{۰/۴۵ \text{ L}} \Rightarrow M = ۰/۲ \text{ mol.L}^{-1} \quad (۰/۲۵)$ <p>یا تبدیل حجم محلول به لیتر (۰/۰۹) فرمول یا جاگذاری (۰/۰۹) جواب (۰/۰۹)</p>	۱/۷۵
۱۳	<p>(آ) مثبت (۰/۰۹) مول های گاز و آنتروپی افزایش یافته است. (۰/۰۹)</p> <p>(ب) منفی (۰/۰۹) واکنش سوختن گرماده است. (۰/۰۹)</p> <p>(پ) منفی (۰/۰۹) هر دو عامل (افزایش آنتروپی و کاهش انرژی) مساعد بوده فرایند خود به خود است. (۰/۰۹)</p>	۱/۵
۲۰	جمع نمره	

همکار محترم؛ لطفاً در صورت مشاهده پاسخ های صحیح و مشابه کتاب (بجز استفاده از تناسب در حل مسائل عددی) نمره منظور فرمایید.